

## Buchstaben-/Schreibmaschinensymbole

- !   ▶ Achtung
- ▶ Fakultät [Faktorenprodukt]
- ▶ Psychiatrie
- ▶ sehr auffällig
- ▶ sehr pathologisch
- X   ▶ Anästhesiebeginn/-ende ▶ Vergrößerung
- ... bis
- ++++ ▶ Blasenbildung oder Erosia [Epikutantest]
- ▶ deutlich nachweisbar [Laborbewertung]
- ▶ normal [Pulsqualität]
- ▶ sehr lebhaft/hyperaktiv [Reflexverhalten]
- ▶ starker Schmerz [Schmerzangabe]
- +++  ▶ deutlicher Schmerz [Schmerzangabe]
- ▶ leicht abgeschwächt [Pulsqualität]
- ▶ gut nachweisbar [Laborbewertung](present in express [A])
- ▶ kissenartig aggregierte Papulovesikeln [Epikutantest]
- ▶ Patient voll ansprechbar -meldet sich bei Bedarf
- ▶ verstärkt [Reflexverhalten]
- "   ▶ dito
- ▶ Zoll [= inch [A] = 2,54 cm]
- ▶ Sekunde
- ▶ Sigmoidoskopie
- ▶ zweiwertig
- =   ▶ Doppelbindung
- ▶ gleich (equal to [A])
- ▶ Gleichstrom
- ▶ Steg [Za]
- +   ▶ abgeschwächt [Reflexverhalten]
- ▶ eben nachweisbar [Pulsqualität]
- ▶ empfindlich [Austestung]
- ▶ empfindlich [Antibiogramm]
- ▶ empfindlich [bei Austestung]
- ▶ erhöht
- ▶ geringer Schmerz [Schmerzangabe]
- ▶ konvex
- ▶ pathologisch
- ▶ plus [Addition]
- ▶ Patient ist somnolent
- ▶ positiv (positive [A])
- ▶ Rötung (schwache Reaktion)[Epikutantest]
- ▶ sensibel
- ▶ signifikant
- ▶ Spur [Laborbewertung]
- ▶ und
- ▶ vorhanden (present [A])
- ▶ Einfachbindung
- ▶ erniedrigt
- ▶ fehlend
- ▶ kein
- ▶ keine Reaktion [Epikutantest]
- ▶ konkav
- ▶ Minus [Subtraktion]
- ▶ negativ (negative [A])
- ▶ nicht
- ▶ nicht vorhanden
- ▶ ohne
- ▶ resistent [Antibiogramm]
- '   ▶ einwertig
- ▶ Minute
- :   ▶ Elektronenpaar
- ▶ geteilt durch [Division]

- ▶ Verhältnis (ratio *[A]*)
- n** Exponent n
- &**
  - ▶ female *[A]*
  - ▶ und (and *[A]*)
- ?**
  - ▶ fraglich [Antibiogramm]
  - ▶ fraglich [bei Austestung]
  - ▶ fragliche bis angedeutete Reaktion [Epikutantest]
  - ▶ unbekannt
  - ▶ zweifelhaft (suspect *[A]*)
- /**
  - ▶ extension *[A]*
  - ▶ Fraktur
  - ▶ geteilt durch [Division]
  - ▶ pro
- \***
  - ▶ Fremdleistung *[Lab]*
  - ▶ geboren [am]
  - ▶ mal [Multiplikation]
  - ▶ Manifestationsortkennzeichnung [ICD-10]
  - ▶ vermutlich
- ./.**
  - ▶ gegen *[Jur]*
  - ▶ Minus [Subtraktion]
- ++**
  - ▶ gemäßiger Schmerz [Schmerzangabe]
  - ▶ nachweisbar [Laborbewertung]
  - ▶ normal [Reflexverhalten]
  - ▶ deutlich abgeschwächt [Pulsqualität]
  - ▶ Patient ist schläfrig, aber jederzeit weckbar, ansprechbar
  - ▶ sehr pathologisch
  - ▶ stark erhöht (present significantly *[A]*)
  - ▶ starke Rötung mit vereinzelt Papulovesikeln [Epikutantest]
  - ▶ stark sensibel [Austestung]
- °**
  - ▶ Grad (degree *[A]*)
  - ▶ Stunde
- °C** Grad Celsius (degree Celsius *[A]*, degré Celsius *[F]*)
- °F** Grad Fahrenheit (degree Fahrenheit *[A]*, degré Fahrenheit *[F]*)
- (**
  - ▶ konkav
  - ▶ Rechtshänder
- )**
  - ▶ konvex
  - ▶ Linkshänder
- (-)**
  - ▶ linksdrehend
  - ▶ negativ [Laborbewertung]
- )(** Lückenschluss *[Za]*
- mal [Multiplikation]
- x**
  - ▶ mal [Multiplikation]
  - ▶ Mittelwert
- %**
  - ▶ male *[A]*
  - ▶ Prozent [vom Hundert](percent *[A]*)
- (+)**
  - ▶ möglicherweise signifikant
  - ▶ Patient reagiert nur auf Schmerzreize, engmaschige Kontrollen erforderlich
  - ▶ rechtsdrehend
  - ▶ resistent
  - ▶ schwach positiv [Austestung]
- °...** nicht/kein (no *[A]*)
- (-)** nicht signifikant
- §** Paragraph
- §§** Paragraphen
- //** Produkt
- ‰** Promille [vom Tausend]
- ( )** selten
- (( ))** sehr selten

- ▶ stark erniedrigt
- +/- unbestimmt/fragwürdig (uncertain/equivocal [A])
- ?... Verdacht auf (query [A])